

PROTECT® proti štěnicím a blechám v mechanickém rozprašovači

Protect® proti štěnicím a blechám je tekutý přípravek v mechanickém rozprašovači k přímému použití, ve vnitřních prostorách budov. Přípravek obsahuje kombinaci vzájemně se doplňujících účinných látek a je účinný na dospělé i larvální stadia. Přípravek je účinný i na druhy rezistentní k pyretroidům.

Přípravek není určen k aplikaci přímo na zvířata.

Použití neprofesionální.


Biocidní přípravek: insekticid, TP 18

Distribuční kategorie: III, biocid bez distribuční registrace

Účinné látky: S – methopren	2,8 g/kg (0,28 %)
přírodní pyrethrum	1,8 g/kg (0,18 %)
piperonyl butoxid	3,6 g/kg (0,36 %)

Oznámeno dle § 35 Zákona č.120/2002 Sb., č.j. MZDR 46637/2011/SOZ, ze dne 29.6. 2011

Výstražné symboly:



Věty o nebezpečnosti:

H225 Vyroce hořlavá kapalina a páry.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před otevřeným plamenem a horkými povrchy – zákaz kouření.

P261 Zamezte vdechování par a aerosolů.

P303+361+353 Při styku s kůží nebo s vlasy: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou, vlasy osprchujte.

P391 Uniklý produkt seberte.

P403+235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Před použitím si důkladně přečtěte tuto etiketu. Přípravkem nesmí být kontaminovány potraviny, nápoje ani krmiva, ani plochy, s kterými tyto přicházejí do kontaktu. Přípravek nesmí být aplikován přímo na zvířata. Přípravek nesmí být používán v rozporu s touto etiketou,

k jiným účelům, jiným způsobem, ani v rozporu s platnými právními předpisy.

Mechanismus účinnosti:

Přípravek Protect[®] proti štěnicím a blechám působí kontaktně a jeho účinné látky se vzájemně doplňují. Přírodní pyrethrum vypudí hmyz z úkrytů a část ho ihned zahubí. Vlivem S-methoprenu, který je růstovým regulátorem hmyzu, ztratí larvální stadia schopnost dít vznik dospělcům a postupně uhynou, dospělé samičky ztratí schopnost klást životaschopná vajíčka. Piperonyl butoxid urychluje vstřebávání obou účinných látek do těla hmyzu a zvyšuje jejich účinnost.

Návod na použití:

Před použitím přípravku důkladně protřepejte, uvolněte bezpečnostní uzávěr, otevřete okna a zajistěte důkladné větrání místnosti. Přípravek aplikujte cíleně do úkrytů a na místa výskytu hmyzu.

Štěnice: aplikujte do jejich denních úkrytů a jejich okolí, tj. do konstrukcí postelí (1), zejména v hlavách postelí (2) pod odchlíplé tapety (3), do švů matrací (4), do konstrukcí nočních stolků (5), pod lišty kolem podlahy a stěn (6), kolem rámců dveří (7), za obrazy (8), pod koberce (9), pod lišty kolem oken (10) a do dalších úkrytů. Lůžkoviny a ložní prádlo přípravkem neošetřujte, ale vyperte obojí bezodkladně při teplotě 60 °C.

Dávkování: 15 ml přípravku, tj. 24-26 zmáčknutí kohoutku rozprašovače, na 1 m² ošetřené plochy. Obsah nádoby stačí na ošetření 30 m² plochy. K dosažení potřebné účinnosti aplikaci opakujte v intervalech 2-3 týdnech až do vymizení štěnic.

Blechy: přípravek je účinný na všechny druhy blech, které napadají člověka a domácí mazlíčky. Přípravek aplikujte na celou plochu podlahy, do všech škvír a na stěny do výše 1 m. Zvýšenou pozornost věnujte pelechům a obydlím domácích mazlíčků, kde se vyvíjejí larvy blech. Přímou na zvířata však přípravek neaplikujte. Po aplikaci přípravku podlahu neomyjte po dobu nejméně 1 týdne. Po umytí podlahy aplikaci opakujte. Na neomytých místech zůstává postřik účinný po dobu 8-9 měsíců.

Dávkování: 5 ml přípravku, tj. 8-10 zmáčknutí kohoutku rozprašovače, na 1 m² ošetřené plochy. Obsah nádoby stačí na ošetření 80 m² ošetřené plochy.

Reg. č.CCHLP: bio/358/D/03/1/ CCHLP.

Upozornění! Během rozprašování nepoužívejte otevřený oheň a nekuřte! Přípravek obsahuje více než 90% ethanolu. Nepostříkujte elektrická zařízení.

První pomoc:

Po nadýchání: postiženého přemístěte na čerstvý vzduch, nechte jej v klidu a v teple. V případě přetrvávajících potíží zajistěte lékařské ošetření.

Při náhodném požití: vypláchněte ústa důkladně vodou, vypijte 0,3 l vlažné vody a nevyvolávejte zvracení. Urychleně vyhledejte lékařskou pomoc!

Při kontaminaci očí: vymývejte minimálně 15min. pitnou vodou, jestliže zarudnutí přetrvává, zajistěte lékařské ošetření.

Při kontaminaci oděvu a pokožky: oděv svlékněte a postižené místo kůže umyjte důkladně teplou vodou a mýdlem. Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyperte.

Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařské ošetření
První pomoc a ošetřující lékař léčbu je možné konzultovat 24 hod. denně s Toxikologickým informačním střediskem, Klinika nemocí z povolání, Vyšehradská 49, Praha 1, 128 21, tel: 224 919 293.

Kontaktní osoba: SLOM s.r.o., Dr. Oldřich Bubrinka, tel. 603 480 024

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech, v suchých a dobře větraných a uzamykatelných prostorách, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, hnojiv, při teplotě vyšší než + 5 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí, nepovolaných osob a domácích zvířat. Chraňte před kontaktem s tepelnými zdroji a přímými slunečními paprsky. Za těchto podmínek a v originálních obalech je možné přípravek skladovat po dobu dvou let.

Likvidace obalů:

Přípravek spotřebujte, prázdný obal vypláchněte a vyhoďte do komunálního sběru. Prázdný obal nepoužívejte k jiným účelům.

Balení: plastický mechanický rozprašovač o obsahu 500 ml

Číslo šarže a datum výroby: na obalu

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby

Výrobce: Bábolna Bio Ltd.

Hungary-1107 Budapest, Szállás u. 6.

Phone.: (36-1) 43-20-400, Fax: (36-1) 43-20-401

E-mail: info@babolna-bio.com

Internet: www.babolna-bio.com

Distributor v ČR: SLOM, s.r.o.

Staromlýnská 47, Zlín-Přiluky, PSČ 760 01

Telefon/Fax : 577 218 701, email: slom@slom.cz, www.slom.cz